

Protokół odkarmiania

Jerzyk zwyczajny (*Apus apus*) / Jerzyk blady (*Apus pallidus*)

Przyjęcie:

- Standardowa procedura przy przyjmowaniu dzikich zwierząt
 - Pomiar wagi, badanie, oznakowanie (obrączki, inne)

Pierwsza pomoc:

- Terapia płynami (5% masy ciała)

- 80% soli fizjologicznej + 20% Duphalyte® (podskórnie) - pachwina (Przed podaniem płynów, powinny być one ogrzane).

- Pasożyty wewnętrzne (profilaktyczne odrobaczanie)

- Praziquantel (Droncit®), (doustnie) tabletki 50 mg rozpuszczone w 20 ml wody (0,1 ml/25mg).

- Pasożyty zewnętrzne (w razie wykrycia)

- Fipronil ([Frontline](#)®) 1 kropla na skórę (na kark) jednorazowo po przyjęciu.

Poważne przypadki – wycieńczenie/wyniszczenie:

- Wielokrotne, doustne podawanie roztworu 90% wody + 10% Glucolyte®, (kilka kropli na krawędź dzioba),
- Kroplówka 24-48 godz., (2 razy dziennie) 80% soli fizjologicznej + 20% Duphalyte® podskórnie, pachwina,
- Od 3 do 7 dni, **Antybiotyk**: Ampicillin - Ampitab® (lek weterynaryjny) lub roztwór 250g Britapen® (lek pediatryczny), (150mg/kg) 2 krople, (doustnie, 2 razy dziennie)

Inne środki: (zanim podasz, zawsze zasięgnij porady wyspecjalizowanego lekarza weterynarii)

- Antyseptyki na bazie jodyny do oczyszczenia ran.
- Na rany zadane przez psy i koty: antybiotyk (Amoksycylina + Clavulanic), 150mg/kg, (doustnie, raz dziennie) przez 10 dni.
- Przeciwgrzybicze: Itraconazol 10mg/kg, (doustnie, raz dziennie), maks. 14 dni – profilaktycznie przy leczeniu antybiotykami (po 4 dniach terapii antybiotykowej).
- Zapalenie skóry: (Pododermatitis): Colistin + tetracyclin 12g, (2 razy dziennie, zastosowanie miejscowo, na skórę).



Warunki przetrzymywania:

- Zaleca się aby w pudełku były niewielej niżeli 3-4 jerzyki, zwłaszcza jeśli konieczna jest ich obserwacja a ich odchody muszą być monitorowane.
- Dobrym rozwiązaniem są plastikowe pojemniki typu "IKEA" wyścielone papierowymi ręcznikami.



Nagie pisklęta / osłabione / poważne wycieńczone

- Maty grzewcze (poduszki elektryczne) w pudełkach, muszą być w taki sposób ułożone aby jerzyki mogły korzystać zarówno z miejsca nagrzanego jak i nienagrzanego.
- W skrajnych przypadkach, kiedy trzeba ratować nieopierzonych jeszcze pisklęta, potrzebować będziemy specjalistycznego sprzętu, który zapewni pisklętom stałą wilgotność i odpowiednią temperaturę.
- W porze karmienia podłoże wyścielające pudełko, w którym umieszczone są jerzyki, musi być każdorazowo kontrolowane, zwłaszcza pod kątem odchodów bądź ich braku.

Karmienie:

- Ważne spostrzeżenia

- Nie należy podawać ptakom pokarmów stałych, dopóki nie są one dostatecznie nawodnione, mimo iż często obserwuje się u nich wzmożoną nadaktywność, której objawem jest usilne domaganie się pokarmu przez wygłodniałe i wycieńczone ptaki.

- Pory karmienia

- Przy normalnym stanie ptaka: co 3 godziny (8:00-11:00-14:00-17:00-20:00)
- Przy stanie poważnym/nagie pisklęta: co 1-2 godziny

- Dieta

- Proponuje się diety oparte na różnych gatunkach owadów.
Zasadniczo zaleca się stosowanie 3 głównych diet, które w odchowie ręcznym jerzyków, dają najlepsze efekty:
 - Mącznik młynarek (90%) + inne gatunki
 - Świerszcz (z dodatkiem barciaka większego)
 - Dieta oparta na różnych gatunkach owadów
- Dieta oparta na mączniku (używana przez autora opracowania) uzupełniana jest innymi owadami takimi jak (świerszcz, barciak, jedwabnik, karaluch, dziko żyjące insekty). Mączniki zawsze przechowuje się żywe i dopiero przed karmieniem zanurza się je w wodzie.
NIGDY SIĘ ICH NIE SUSZY ANI NIE ZAMRAŻA.
- Pozostałe owady można trzymać zamrożone i odmrażać w razie potrzeby.



- Ilość

Młode jerzyki dopominające się pokarmu: do woli (do 20 g dziennie)

Wymuszone karmienie: \pm 4 g owadów (15-20 g dziennie)

- Metoda karmienia

- Należy delikatnie ale pewnie przetrzymać ptaka (używając do tego chusteczki by nie zniszczyć ani nie zabrudzić jego upierzenia)
- Przytrzymując głowę, należy ostrożnie otworzyć dziób prawym palcem wskazującym wkładając paznokieć między górną a dolną jego część.
- Lewym palcem wskazującym należy przytrzymać lekko rozchylony dziób.
- Ostrożnie umieścić owady w tylnej części gardła przy pomocy pęsety i puścić dziób.
- Wspomóc odruch przełykania poprzez łagodne głaskanie gardła.


- Suplementy - WAŻNE

- Codziennie, podczas jednego karmienia, posypać owady suplementami witaminowymi i minerałami (N.p.: Nekton S, Nekton Bio, Korvimin...)
- Raz w tygodniu - glukonian wapnia
- Raz w tygodniu, jeden owad nasączony w roztworze witaminy B Complex (Można podawać doustnie lub podskórnie)
- Zaleca się również podawanie probiotyków.



Wypuszczenie:

- Przed wypuszczeniem ptaka na wolność, należy dokładnie sprawdzić stan jego upierzenia gdyż to ono decyduje o tym czy ptaka można wypuścić na wolność czy nie ale tak naprawdę to zawsze ptak decyduje o tym czy jest gotowy do lotu.
- Zdrowy, odkarmiony ręcznie jerzyk z łatwością wystartuje z ręki (a nawet z ziemi!), jeśli nie chce lecieć, próbę wypuszczenia należy ponowić następnego dnia.
- Nigdy nie należy zmuszać jerzyka do lotu podrzucając go do góry !!!
- Nigdy nie zaleca się wypuszczać jerzyków z wysoko położonych miejsc lub budynków, gdyż w razie niepowodzenia ptak może uderzyć w ziemię z nieodwracalnymi skutkami.
- Jerzyka powinno się wypuszczać na obszarze, tam gdzie w razie niepowodzenia łatwo będzie można udzielić mu pomocy.



ciotnegre.com
wift-help.org

