

WOLONTARIAT WYSOKICH LOTÓW

Postępowanie z podlotami i pisklętami

Rafał Bobrek

Warszawa, 22 lutego 2019 r.



Projekt współfinansowany ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020



Czym jest podlot?




- stadium spotykane u gniazdowników;
- pisklę, które opuściło już gniazdo, ale jeszcze całkowicie się nie usamodzielniało;
- opierzone, lepiej lub gorzej latające;
- często przebywające na ziemi;
- karmione (dokarmiane);
- pozostaje pod opieką rodziców, ale nie ciągle;
- nie jest to ptak opuszczony, wyrzucony z gniazda itp.;



Znalazłem podlota!



- głównie w miesiącach maj-lipiec;
- w miastach często w parkach, na trawnikach;
- czy wymaga pomocy?
czasem tak, ale najczęściej **NIE!**
- kiedy potrzebna interwencja?
 - ✓ **niebezpieczna lokalizacja** (jezdnia, chodnik);
 - ✓ potencjalna **obecność psów/kotów**;
 - ✓ jest **atakowany** (pies, sroka, człowiek);
 - ✓ jest widocznie **ranny lub chory**;
- w większości przypadków pozostawiamy podlota w spokoju!



Dlaczego nie interweniować?




- nie porywajmy podlotów, rodzice zajmą się nimi najlepiej;
- pozbawimy go „szkoły życia”;
- ✓ nauka przekazywana przez rodziców (schronienie, pokarm, drapieżniki);
- ✓ dorastanie w środowisku naturalnym – samodzielność;
- przyzwyczajenie do/uzależnienie od ludzi;



Kiedy i jak interweniować?



- **niebezpieczna lokalizacja (jezdnia, chodnik);**
przenieść, przegonić w bezpieczniejsze miejsce;
- **potencjalna obecność psów/kotów;**
przenieść w bezpieczniejsze miejsce;
- **jest atakowany (pies, sroka, człowiek);**
odgonić intruza, wezwać straż miejską;
- **jest widocznie ranny lub chory;**
wezwać straż miejską lub samodzielnie przetransportować do weterynarza lub azylu dla ptaków (docelowo);



Pisklęta



- puch, niekompletne upierzenie lub jego brak;
- zwykle w gnieździe (u gniazdowników), dlatego znajdowane rzadziej niż podloty;
- zwykle zupełnie niesamodzielne;
- żebrzą o pokarm;



Pisklęta – interwencje




- pisklę zwykle nie jest w stanie przeżyć poza gniazdem;
 interwencja zwykle niezbędna
(nie dot. starszych piskląt sów oraz zagniazdowników!)
- interwencja = przekazanie pisklęcia specjalście;
- pomoc zbyt trudna i pracochłonna dla osoby niewprawionej;
- zabezpieczenie przed wychłodzeniem;
- ew. napojenie;
- karmienie może zaszkodzić!
- liczy się czas – zalecany kontakt telefoniczny z azylem/ośr. rehabilitacji;
- im starsze pisklę, tym ma większe szanse;



Rozpoznawanie



- młode pisklęta różnią się zaskakująco nieznacznie;
- cechy rodzin, rodzajów i gatunków nabywane są z czasem;
- wystarczy wiedzieć, do jakiej grupy ptaków należy znalezione pisklę;



Rozpoznawanie





- zagniazdowniki – **ptaki wodno-błotne**



Rozpoznawanie



- zagniazdowniki – kuraki



Rozpoznawanie




- gniazdownicy – **sowy i drapieżne**



Rozpoznawanie

- gniazdowniki – **gołębie**



Rozpoznawanie



- gniazdownicy – **jerzyk**



Rozpoznawanie

- gniazdowniki – **wróblowe: drozdy**



Rozpoznawanie




- gniazdowniki – **wróblowe: drobne owadożerne**



Rozpoznawanie



- gniazdownicy – **wróblowe: ziarnożady**



WOLONTARIAT WYSOKICH LOTÓW

Źródła i autorzy fotografii:

- domena publiczna, na podstawie licencji *Creative Commons 0* (CC-0);
- archiwum projektu Wolontariat Wysokich Lotów.



Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
rafal.bobrek@otop.org.pl



www.otop.org.pl



www.facebook.com/OTOP.BirdlifePolska