





WARUNKI WODNE TORFOWISK BALIGÓWKA, KACZMARKA, BÓR ZA LASEM W KOMPLEKSIE TORFOWISK ORAWSKO-NOWOTARSKICH W 2024 R.



Paweł Pawlaczyk, Dorota Horabik, Robert Stańko - Klub Przyrodników, LIFE20 CCM/DE/001802 MultiPeat project –
kontakt: pawel.pawlaczyk@kp.org.pl



Torfowiska Baligówka, Kaczmarka, Bór Za Lasem są torfowiskami mszarnymi należącymi do kompleksu Torfowisk Orawsko-Nowotarskich, na Orawie i Podhalu w pd. Polsce. Centralne ich części zajmuje roślinność charakterystyczna dla torfowisk wysokich, a części brzeżne – bory bagienne. Poziom wody w torfie jest od jesieni 2023 r. monitorowany za pomocą automatycznych rejestratorów w piezometrach.

Dane za rok hydrologiczny 2024 sugerują, że reżim wodny tych torfowisk jest nieco inny, niż typowy reżim wodny torfowisk wysokich na niżu – w dobrze zachowanych częściach poziom wody jest bardzo stabilny, nie wykazując sezonowej zmienności, typowej dla torfowisk na niżu. Skutki odwodnienia rowami wyrażają się w naruszeniu tej stabilności i okresowych spadkach poziomu wody. Reakcja na opad jest różna w różnych częściach torfowisk. Trwałe odwodnienie dotyka brzeżnych partii torfowisk, zwłaszcza przy krawędziach ukształtowanych przez pozyskanie torfu od brzegów.

Lokalizacja i przykład przegród na Baligówce



W listopadzie 2024 r. w ramach działań ochronnych dokonano „przebudowy” rowów odwadniających i ich pozostałości, wykonując przegrody drewniane i drewniano-ziemne typu ścianki szczelnej, blokujące odpływ wody rowami.

Gęsta sieć rowów i resztek rowów na Baligówce wymagała zablokowania odpływu w 135 punktach. Na torfowiskach: Kaczmarka i Bór Za Lasem zamknięto odpływ rowami na brzegach, odpowiednio w 12 i w 4 punktach.

Skutki tych działań będą monitorowane w kolejnych latach.

